

اثر ترکیبات ماده آلبورز و بازده تولید نهال کاج بروسیا و کاج حلب

فاطمه احمدلو^۱، مسعود طبری^۲، احمد رحمانی^۳، حامد یوسفزاده^۴ و یحیی کوچ^۵

^۱دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

^۲دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

^۳استادیار پژوهش گروه خاکشناسی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

^۴دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

(تاریخ دریافت: ۸/۲/۸۸، تاریخ تصویب: ۱۲/۸/۸۸)

چکیده

در این تحقیق، وضعیت رشد، زیست‌مانی و عملکرد نهال‌های سوزنی برگ کاج بروسیا (*Pinus brutia* Ten.) و کاج حلب (*P. halepensis* Mill.) در ترکیبات متفاوت مواد آلبورز در نهالستان کلوده آمل بررسی شد. بذرها در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با چهار تکرار در گلدان‌های پلاستیکی و تیمارهای مختلف خاک شامل (۱) خاک نهالستان (شاهد؛ ۲) خاک شاهد:کود دامی (۵:۱)، (۳) خاک شاهد:خاکبرگ (۱:۵) و (۴) خاک شاهد:کود دامی:خاکبرگ (۱:۱:۵) کاشته شد. بعد از یک سال مشخص شد که در هر دو گونه، نهال‌های رشدیافته در تیمار ۴، دارای بیشترین زنده‌مانی، رشد طولی ساقه، قطر یقه، شاخص بنیه نهال، وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک کل و شاخص کیفیت نهال بود. همچنین همبستگی مثبت بهنسبت قوی بین بیشتر عناصر تغذیه‌ای خاک با صفات زنده‌مانی، طول ساقه، قطر یقه، وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه در هر دو گونه وجود داشت. در اغلب صفات مورد بررسی، کاج بروسیا پاسخ بهتری نسبت به کاج حلب نشان داد. نتایج تحقیق بیانگر این است که ترکیبات بیشتر مواد آلبورز بهبود شرایط فیزیکی و تغذیه‌ای بستر کاشت، سبب افزایش تولید کمی و کیفی نهال‌ها شده‌اند.

واژه‌های کلیدی: بستر کاشت، زنده‌مانی، زیست‌مانی، شاخص بنیه نهال، شاخص کیفیت نهال.

مقدمه و هدف

بررسی این وضعیت بر روی نهال‌های *Abies pinsapo* Boiss با تیمارهای کوددهی ۲۳۴، ۳۹۷ و ۳۹۷ میلی‌گرم ازت نسبت به شاهد (بدون کوددهی) بیانگر افزایش زنده‌مانی، رشد ارتفاعی، قطر یقه، نسبت ارتفاع به قطر و زی توده اندام هوایی نهال بود (*Navarro et al., 2006*). به نظر (*Guerrero et al.*, 2002) پوسته کاج و مخلوط فاضلاب شهری، تیمارهای مطلوبی برای افزایش بازده نهال‌های *Cupressus arizonica* Greene و *P. pinea* است. کیانی (۱۳۷۸) در تحقیقی در نهالستان لakan رشت، بیشترین وزن خشک ریشه و ساقه نهال‌های گلستانی و ریشه لخت *P. taeda* را در ترکیب خاک، ماسه و کود دامی پوسيده به نسبت ۱:۴:۲ به دست آورد.

با توجه به نتایج بالا که کود آلی می‌تواند با تغییر شرایط تغذیه‌ای بستر، موجب افزایش عملکرد نهال شود و همچنین کمود تغذیه‌ای و کاهش عملکرد تولید نهال در خاک نهالستان مورد بررسی (کلوده آمل) (رحمانی و همکاران، ۱۳۸۵)، هدف تحقیق حاضر این است که با استفاده از تیمارهای مختلف خاک با درصد متفاوتی از عناصر تغذیه‌ای، اثر عناصر تغذیه‌ای بستر کاشت بر شدت مرگ و میر نهال‌ها، رشد، زی توده و بازده تولید نهال دو گونه سوزنی برگ کاج بروسیا (*P. brutia*) و کاج حلب (*P. halepensis*), به منظور تعیین مناسب‌ترین ترکیب کود آلی با خاک به تفکیک هر گونه بررسی شود. تعیین مقدار تولید و خصوصیات کمی و کیفی نهال‌های دو گونه با تیمارهای مختلف خاک هدف فرعی این تحقیق است.

مواد و روش‌ها

محل پژوهش، نهالستان کلوده واقع در ۱۰ کیلومتری شهر آمل (۱۷° شرقی و ۳۶° ۳۴' شمالی)، با ارتفاع ۶ متر از سطح دریا، متوسط بارندگی سالیانه ۸۳۰ میلی‌متر، میانگین دمای حداقل ۶/۶ درجه سانتی‌گراد و میانگین دمای حداکثر ۲۷/۲ سانتی‌گراد است. در این تحقیق بذر گونه‌های *P. brutia* و *P. halepensis* از مرکز بذر جنگلی خزر آمل با خصوصیات یادشده در جدول ۱ با یکنواختی اندازه و وزن و سپس چهار ترکیب مختلف خاک مطابق جدول ۲ تهیه شد. طرح به صورت بلوك کامل تصادفی با

یکی از راهکارهای مهم افزایش بازده تولید نهال (کمی و کیفی) در نهالستان‌های جنگلی، مدیریت بهینه ترکیب بستر کاشت (بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک) است. برای بهبود خصوصیات خاک نهالستان از کودهای مختلف مثل کود سبز، کود دامی، کود شیمیایی و کود بیولوژیک استفاده می‌شود. امروزه به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی و کاهش حاصلخیزی خاک در پی کاربرد طولانی‌مدت کودهای شیمیایی، باید به فکر جایگزین‌های بهتری از جمله استفاده از ترکیبات مواد آلی بود (*Katalin et al., 2005*). با توجه به اینکه عناصر تغذیه‌ای مواد آلی به تدریج در اختیار گیاه قرار می‌گیرند، بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک موجب افزایش رشد، زی توده، زنده‌مانی و بازده نهال می‌شود، به طوری که غلظت مطلوب عناصر تغذیه‌ای خاک سبب توانایی بیشتر گیاه برای افزایش رشد و مقدار فتوسنتز و مقاومت بیشتر به استرس‌های محیطی می‌شود (*Will et al., 2006*). (*Cobb et al., 2008*). نیز در بررسی تأثیر افزایش مقدار نیتروژن خاک بر بازده گیاه، نتیجه گرفته که وزن خشک ساقه نهال *Pinus elliottii* Engelm با *Pinus taeda* L. و *Liquidambar styraciflua* L. و *P. taeda* L. و *P. styraciflua* و طول ساقه *occidentalis* با کوددهی ازت در مقدادر ۵۷، ۸۵ و ۱۱۴ کیلوگرم در هکتار در سال افزایش می‌یابد. در تحقیق دو ساله (*Larcheveque et al., 2006*) استفاده از کمپوست ضایعات سبز و لجن فاضلاب به مقدار ۲۰ و ۴۰ کیلوگرم در متر مربع و بدون کمپوست (شاهد)، زنده‌مانی، رشد و غلظت عناصر تغذیه‌ای برگ نهال‌های *Quercus ilex* L. با *Pinus pinea* L. و *P. halepensis* (*2006*) نیز در تحقیقی با ترکیبات مختلف مواد آلی *Marianthi* نتیجه گرفت که تیمار ۷۰ پیتماس و ۳۰ سبوس بر رشد نهال‌های *P. halepensis* مؤثرتر است. در بررسی وضعیت تغذیه‌ای و رشد نهال‌های گلستانی *P. halepensis* با تیمارهای کوددهی مایع با سه مقدار کم (۳ گرم در لیتر)، متوسط (۵ گرم در لیتر) و زیاد (۷ گرم در لیتر)، رشد طولی و قطری افزایش یافت (*Oliet et al., 2004*). نتیجه

تیمار (گونه - خاک) به طور تصادفی انتخاب و ریشه و ساقه آن‌ها (پس از جدا شدن) در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت در آون قرار داده شد و سپس توزین شد (Cobb *et al.*, 2008). برای تعیین مقدار پتانسیم، کلسیم و منیزیم تیمارهای خاک از دستگاه جذب اتمی، برای تعیین غلظت نیتروژن از دستگاه کجلاال و برای تعیین غلظت فسفر نیز به روش مولیدن و وانادات، از دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد (زرین‌کفش، ۱۳۷۲). زنده‌مانی نهال‌ها در اسفند ماه با شمارش تعداد نهال‌های موجود در نهال‌ها در استفاده از فرمولهای زیر محاسبه شد:

$$QI = \frac{T}{RW/(SW+D/H)} \quad (1)$$

QI، شاخص کیفیت نهال؛ T، وزن خشک کل نهال؛ RW، وزن خشک ریشه؛ SW، وزن خشک اندام هوایی؛ D، قطر و H، ارتفاع اندام هوایی است.

$$VI = (H \times RL) \times G \quad (2)$$

VI، شاخص بنیه نهال؛ H، ارتفاع اندام هوایی؛ RL، طول ریشه و G، درصد جوانه‌زنی است.

چهار تکرار برای هر تیمار و با ۲۰ گلدان پلاستیکی برای هر تکرار با ابعاد $20 \times 15 \times 15$ سانتی‌متر و در کل ۳۲۰ گلدان پلاستیکی برای هر یک از گونه‌ها انجام شد. در هر گلدان سه بذر با توجه به قوّه نامیه که به مدت ۲۴ ساعت در آب مقطر خیسانده شده بودند (Navarro *et al.*, 2006)، در عمق حدود ۱ سانتی‌متری خاک، با لایه نازکی از مخلوط شن و سیوس در ۲۱ اسفند ۱۳۸۵ کاشته شد. در شروع آزمایش، آنالیز تیمارهای خاک با چهار تکرار انجام شد (جدول ۳). برای ضد عفونی بذرها از قارچ‌کش کربوکسین تیرام (ویتاواکس)^۱ به نسبت دو در هزار استفاده شد. بعد از کامل شدن دوره جوانه‌زنی، فقط یک نهال (بهترین نهال) در هر گلدان پلاستیکی برای مشاهده شاخص‌های اولیه رشد نهال باقی ماند. مراقبت‌های لازم از جمله آبیاری مصنوعی با رعایت ظرفیت زراعی خاک (در تابستان، هر روز و در دیگر فصل‌ها، با توجه به شرایط آب و هوایی)، برداشت علف هرز به طور مرتب در هر ۱۰ روز (به صورت دستی) و هرس ریشه عمودی دو بار در طی دوره انجام گرفت. در طول دوره جوانه‌زنی بذرها و رشد نهال‌ها، به همه گلدان‌ها در فصل گرما و دوره رویش، با مشاهده تغییر رنگ ساقه نهال‌ها در اثر گرما و بروز قارچ، محلول‌های قارچ‌کش دودین^۲ (۲ در هزار)، کاپتان^۳ (۱ در هزار) + (کود میکرو و کود ماکرو به صورت مخلوط)، رورال^۴ (۲ در هزار) (اپیرودیون+کاربندازیوم) + کود مایع (به صورت مخلوط) و رورال (۲ در هزار) (اپیرودیون+کاربندازیوم) موجود در نهالستان به منظور ضد عفونی خاک اضافه شد. شاخص‌های کمی طول ساقه و قطر یقه به ترتیب با دقت ۰/۱ سانتی‌متر و ۰/۱ میلی‌متر و نسبت طول ساقه به قطر یقه (ضریب قدکشیدگی) محاسبه شد. نرخ رشد نسبی ارتفاعی^۵ ($mm\ cm^{-1}\ d^{-1}$) و نرخ رشد نسبی قطری^۶ ($\mu m\ cm^{-1}\ d^{-1}$) همچون نرخ افزایش ارتفاع و قطر نهال طبق معادله ارائه شده در جدول ۴ محاسبه شد (Ostos *et al.*, 2008). دوازده ماه بعد از کاشت، سه نهال در هر ترکیب

1- Carboxin Tiram (Vitawax)

2- Dodin

3- Kaptan

4- Revral

5- RGR_H

6- RGR_D

جدول ۱- خصوصیات بذرهای مورد بررسی

گونه	مبدأ بذر	قوه نامیه (درصد)	خلوص (درصد)	رطوبت (درصد)	تعداد (در کیلوگرم)
کاج بروسیا	خرمآباد	۸۰	۱۰۰	۴/۲	۱۸۵۵۶
کاج حلب	پاسند	۸۸	۹۹/۹	۶/۹	۴۲۱۲۳

جدول ۲- نسبت حجمی اجزای خاک و مقدار جوانهزنی در هر تیمار خاک

تیمارها	خاک لومی	خاک ماسه	سبوس	پوسیلde جامد	خاکبرگ	کاج بروسیا	کاج حلب	درصد جوانهزنی
خاک نهالستان (شاهد) (تیمار ۱)	۳	۱	۱	-	-	۵۶/۶۷	۵۶/۶۷	۵۶/۶۷
خاک شاهد: کود دامی (تیمار ۲)	۳	۱	۱	۱	-	۶۸/۷۵	۶۸/۷۵	۷۶/۶۶
خاک شاهد: خاکبرگ (تیمار ۳)	۳	۱	۱	-	۱	۶۹/۱۶	۷۸/۳۳	۶۹/۱۶
خاک شاهد: کود دامی: خاکبرگ (تیمار ۴)	۳	۱	۱	۱	۱	۷۵/۸۳	۷۵/۸۳	۸۳/۴۳

جدول ۳- میانگین مشخصات شیمیایی تیمارهای خاک مورد بررسی و نیز مواد آلی (کود دامی و خاکبرگ)

کربن (درصد)	۲/۲۸	۳/۸۴	۲/۶۴	۵/۱۶	۴/۴۴	تیمار ۴	تیمار ۳	تیمار ۲	تیمار شاهد (۱)	تیمارها
ماده آلی (درصد)	۳/۹۲۱	۶/۶۰۴	۴/۵۴	۸/۸۷۵	۷/۶۳۶	۱۰/۱۱۳	۵/۸۸	۴/۴۴	۵/۱۶	۵/۸۸
ازت (درصد)	۰/۰۳۶	۰/۱۳۴	۰/۰۸۴	۰/۲۲۷	۰/۹۴	۰/۷۴۵				ازت
کربن به ازت	۶۴/۶۲	۲۸/۶۷	۱۴/۷	۲۲/۷۴	۴/۷۲	۷/۸۹				کربن
فسفر قابل جذب	۱۱/۷۶	۱۴/۷	۲۵/۲	۵۰/۴	۲۶/۱	۲۳/۲				فسفر
پتاسیم قابل جذب	۲۷/۵	۷۶	۴۴	۹۰/۵	۸۷/۸	۷۸				پتاسیم
کلسیم تبادلی	۳۵/۳۵	۳۶/۱۵	۳۹/۵۲	۴۹/۵	۵۷/۰۵	۴۵/۷				کلسیم
منیزیم تبادلی	۲۹	۴۲	۳۲	۵۹	۴۸/۳	۵۰				منیزیم
هدایت الکتریکی	۰/۱۹۲	۰/۲۶۵	۰/۲۵۶	۰/۲۲۴	۰/۲۲	۰/۲۴				هدایت الکتریکی
pH	۸/۲۸	۸/۰۸	۸/۰۱	۷/۹۷	۷/۳۰	۷/۵۸				pH

واحدهای عناصر فسفر و پتاسیم قابل جذب، کلسیم و منیزیم تبادلی بر حسب (میلی گرم بر کیلوگرم) و هدایت الکتریکی بر حسب (دسی زیمنس بر متر) است.

جدول ۴- معادله محاسباتی و نحوه تعیین واحدهای نرخ رشد نسبی ارتفاعی و قطری

معادله محاسباتی	نحوه تعیین واحدهای نرخ رشد نسبی
$RGR_H = \frac{\ln H_2 - \ln H_1}{t_2 - t_1}$	فرمول ریاضی $\ln H_2 / H_1$ برابر است با $\ln H_2 - \ln H_1$ با توجه به فرمول ریاضی $\ln H_2 = d H_2 / H_2$ ، مشتق واحد H_2 ، میلی‌متر است. واحد H_1 بر حسب سانتی‌متر است که با قرار گرفتن در صورت، توان ۱- می‌گیرد. واحد زمان بر حسب روز (d)
$RGR_D = \frac{\ln D_2 - \ln D_1}{t_2 - t_1}$	فرمول ریاضی $\ln D_2 / D_1$ برابر است با $\ln D_2 - \ln D_1$ با توجه به فرمول ریاضی $\ln D_2 = d D_2 / D_2$ ، مشتق واحد D_2 ، میکرومتر است. واحد D_1 بر حسب میلی‌متر است که با قرار گرفتن در صورت، توان ۱- می‌گیرد. واحد زمان بر حسب روز (d)

t_1 و t_2 ارتفاع نهال بر حسب سانتی‌متر
 D_1 و D_2 قطر نهال بر حسب میلی‌متر
 \ln لگاریتم طبیعی

t_1 و t_2 ارتفاع نهال بر حسب سانتی‌متر
(زمان) که بستگی به ترتیب زمان‌های نمونه‌برداری دارد

خشک ریشه با مقدار نیتروژن و پتاسیم قابل جذب و بین طول ساقه و قطر یقه با مقدار منیزیم تبادلی وجود دارد (جدول ۵). بین طول ریشه در هر دو گونه مورد بررسی با عناصر تغذیه‌ای خاک همبستگی وجود ندارد (جدول ۵).

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار (15) SPSS صورت گرفت. ابتدا شرط نرمال بودن داده‌ها با آزمون Kolmogorov-Smirnov و همگنی واریانس داده‌ها بهوسیله آزمون Levene بررسی شد. برای تعیین اثر تیمارهای مختلف خاک بر صفات کمی و کیفی نهال، به طور جداگانه برای هر گونه از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه استفاده شد. در صورت معنی‌دار بودن اثر تیمارهای برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن و برای مقایسه صفات مورد بررسی بین نهال‌های دو گونه از آزمون t استفاده شد. آزمون همبستگی پیرسون نیز برای ارتباط بین غلظت عناصر تغذیه‌ای خاک و شاخص‌های رشد و بازده نهال‌های کاج بروسیا و کاج حلب به کار گرفته شد.

نتایج

- همبستگی بین غلظت عناصر تغذیه‌ای خاک و شاخص‌های زنده‌مانی، رشد و زی‌توده نهال نتایج نشان می‌دهد که در گونه کاج بروسیا، بین درصد زنده‌مانی، طول ساقه، قطر یقه، وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه با مقدار نیتروژن و فسفر قابل جذب و همچنین بین طول ساقه و قطر یقه با مقدار کلسیم تبادلی، همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد (جدول ۵)، در گونه کاج حلب نیز همبستگی معنی‌داری بین درصد زنده‌مانی، طول ساقه، قطر یقه، وزن خشک ساقه و وزن

جدول ۵- همبستگی بین غلظت عناصر تغذیه‌ای خاک و پارامترهای زنده‌مانی، رشد و زی توده نهال

منیزیم تبادلی		کلسیم تبادلی		پتاسیم قابل جذب		فسفر قابل جذب		درصد نیتروژن	
کاج حلب	کاج بروسیا	کاج حلب	کاج بروسیا	کاج حلب	کاج بروسیا	کاج حلب	کاج بروسیا	کاج حلب	کاج بروسیا
۰/۳۲۷	۰/۳۷۷	۰/۲۷۵	۰/۴۵۷	۰/۶۸۳***	۰/۶۳۸***	۰/۴۶۳	۰/۵۷۲*	۰/۶۷۶***	۰/۶۳۶***
۰/۵۰۹*	۰/۳۹۴	۰/۰۹۸	۰/۵۱۳*	۰/۷۲۹***	۰/۶۵۴***	۰/۴۲	۰/۷***	۰/۶۵۵***	۰/۷۲۲***
۰/۶۱۷*	۰/۱۹۹	—/۰۲۲۴	۰/۵۴۷*	۰/۷۳۵***	۰/۴۰۳	۰/۱۸۸	۰/۶۰۹*	۰/۶۰۸*	۰/۵۶۵*
—/۰/۴۲۹	۰/۰۷۳	—/۰/۳۰۸	۰/۱۸۵	۰/۰۸۱	۰/۱۳۵	۰/۲۴۵	۰/۰۷	۰/۲۰۹	۰/۱۳۶
۰/۲۰۳	۰/۶۲۳***	۰/۳۴۲	۰/۳۳	۰/۷۹***	۰/۶۵۳***	۰/۶۴***	۰/۸۹۱***	۰/۸۶۴***	۰/۸۳۸***
۰/۲۴۹	۰/۳۴۲	۰/۱۸۶	۰/۴۷۲	۰/۸۳۸***	۰/۶۱*	۰/۷۲۲***	۰/۵۹۶*	۰/۹۱***	۰/۶۷***

*: همبستگی معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد **: همبستگی معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد
طول ساقه و طول ریشه بر حسب سانتی متر، قطر یقه بر حسب میلی متر، وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه بر حسب گرم
واحدهای عناصر فسفر و پتاسیم قابل جذب، کلسیم و منیزیم تبادلی بر حسب (میلی گرم بر کیلوگرم) است.

از تیمارهای خاک، نرخ رشد ارتفاعی و قطری، روندی کاهشی را در طول زمان نشان می‌دهد. در هر یک از زمان‌های اندازه‌گیری در هر دو گونه، بیشترین نرخ رشد نسبی ارتفاعی متعلق به تیمار ۴ و کمترین آن در گونه کاج بروسیا در تیمار شاهد و در گونه کاج حلب در تیمار ۳ است (شکل ۱). نرخ رشد نسبی قطری در هر دو گونه در تیمار ۴ بیشترین و در تیمار شاهد کمترین است (شکل ۲).

- صفات زنده‌مانی و رشد
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد زنده‌مانی، طول ساقه، قطر یقه، طول ریشه به ساقه و شاخص بنیه نهال در هر دو گونه مورد بررسی در تیمارهای مختلف خاک، متفاوت است (جدول ۶). به طور کلی، بیشتر این شاخص‌ها از اندازه بزرگتری در خاک‌های حاوی مواد آلی، در مقایسه با تیمار شاهد، برخوردارند (جدول ۷). همچنین در هر یک

جدول ۶- نتایج تجزیه واریانس بین تیمارهای مختلف خاک و شاخص‌های زنده‌مانی و رشد در دو گونه کاج بروسیا و کاج حلب

P		F		صفات مورد مطالعه
کاج حلب	کاج بروسیا	کاج حلب	کاج بروسیا	
۰/۰۰۰*	۰/۰۰۰*	۲۲/۴۶۲	۲۶/۸۳۷	درصد زنده‌مانی
۰/۰۰۸*	۰/۰۰۰*	۶/۲۸	۱۶/۲۶	طول ساقه (سانتی متر)
۰/۰۰۷*	۰/۰۰۶*	۶/۶۲	۶/۸	قطر یقه (میلی متر)
۰/۱۹۲ns	۰/۶۶۱ns	۱/۸۵	۰/۵۵	طول ریشه (سانتی متر)
۰/۰۶۴ns	۰/۰۲۳*	۳/۱۶	۴/۶	طول کل نهال (سانتی متر)
۰/۶۱۶ns	۰/۰۰۰*	۰/۶۲	۱۳/۳۸	طول ساقه به قطر یقه
۰/۰۱۹*	۰/۰۰۰*	۴/۹۱	۱۶/۸۹	طول ریشه به ساقه
۰/۰۰۴*	۰/۰۰۲*	۷/۶۵	۸/۹	شاخص بنیه نهال
۰/۳۶۸ns	۰/۰۰۱*	۱/۱۵۴	۱۲/۵۱۸	نرخ رشد نسبی ارتفاعی
۰/۲۷۱ns	۰/۰۱۶*	۱/۴۷۴	۵/۱۹۴	نرخ رشد نسبی قطری

*: معنی دار بودن اختلاف بین میانگین‌ها ns: عدم تفاوت معنی دار بین میانگین‌ها


جدول ۷- میانگین صفات درصد زنده‌مانی، رشد و شاخص بنیه نهال‌های یکساله گلداری کاج بروسیا و کاج حلب تولیدشده در ۴ ترکیب مختلف رشد

(تیمار ۴) کاج حلب	کاج بروسیا				درصد زنده‌مانی
	(تیمار ۳)	(تیمار ۲)	(تیمار ۱)	(تیمار ۴)	
۹۲/۵(۱/۴)a	۹۲/۵(۱/۰۲)a	۹۰/۶(۰/۶۲)a	۷۶/۹(۲/۶)b	۹۴/۴(۰/۶۳)a	۹۳/۱(۱/۲)a
۱۳/۷(۰/۵۴)a	۱۲/۱(۰/۸۶)a	۱۳/۹۳(۱/۳)a	۸/۶۴(۱)b	۲۰(۰/۹)a*	۱۸/۱(۱)ab*
۲/۹(۰/۲۸)a	۲/۷(۰/۰۸)a	۳/۲۱(۰/۱)a	۲/۱(۰/۱۷)b	۴/۰۲(۰/۲)a	۳/۱۹(۰/۲)b
۱۶/۰۹(۱/۷)	۱۳/۵۲(۱/۲)	۱۱/۹۴(۰/۴)	۱۴/۴(۱/۴۶)	۲۲/۸(۰/۳)*	۲۳/۷(۲/۶)
۲۹/۷۹(۲)	۲۵/۵۳(۱/۷)	۲۵/۸۷(۱/۵)	۲۲/۹۹(۰/۸)	۴۲/۸(۱/۲)a*	۴۱/۷۸(۳/۶)a
۴/۸۲(۰/۳۶)	۴/۵(۰/۳۴)	۴/۴(۰/۵۸)	۴/۰۷(۰/۱۹)	۵(۰/۱۵)a	۵/۷(۰/۱)a*
۱/۲(۰/۱)b	۱/۱۳(۰/۱)b	۰/۹(۰/۰۶)b	۱/۸(۰/۳۱)a	۱/۲(۰/۰۴)c	۱/۳(۰/۰۸)bc
۱۸۵۲۹/۴a	۱۲۸۰۴/۷b	۱۲۹۵۹/۷b	۶۷۸۴/۵c	۳۴۶۵۴/۹a*	۳۰۱۳۳/۶ab
(۲۴۰۵/۱)	(۱۵۸۹/۳)	(۱۸۳۸/۹)	(۵۸۵/۸)	(۲۲۵۲/۹)	(۴۹۹۱/۵)
۰/۰۰۵۵	۰/۰۰۵	۰/۰۰۴	۰/۰۰۳۶	۰/۰۰۸۲a*	۰/۰۰۶۹ab
۰/۰۰۳۵	۰/۰۰۲۹	۰/۰۰۳۳	۰/۰۰۲۲	۰/۰۰۵۹a	۰/۰۰۳۴b
					۰/۰۰۳۶b
					۰/۰۰۳۶b


اعداد داخل پرانتز اشتباہ از معیار هستند. حروف مختلف در ستون مبین معنی دار بودن میانگین‌ها در سطح احتمال ۰/۰۵ با آزمون دانکن است.

* نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف صفت مورد بررسی در تیمار خاک مشابه بین دو گونه با استفاده از آزمون t است.

تیمار (۱): خاک نهالستان (شاهد)، تیمار (۲): خاک شاهد:کود دامی (۱:۵)، تیمار (۳): خاک شاهد:خاکبرگ (۱:۵)، تیمار (۴): خاک شاهد:کود دامی:خاکبرگ (۱:۱:۵)



شکل ۱- نرخ رشد نسبی ارتفاعی ($\text{mm cm}^{-1} \text{d}^{-1}$) برای گونه‌های مورد بررسی در بسترهای مختلف رشد

شکل ۲- نرخ رشد نسبی قطری ($\mu\text{m mm}^{-1} \text{d}^{-1}$) برای گونه‌های مورد بررسی در بسترها مختلف رشد

به طوری که در هر دو گونه، تیمار ۴ در بیشتر صفات دارای بیشترین مقدار و تیمار شاهد دارای کمترین مقدار است (جدول ۹).

- صفات زی توده
نتایج نشان می‌دهد که تیمار خاک بر وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک کل و شاخص کیفیت نهال هر دو گونه مورد بررسی اثر گذاشته است (جدول ۸).

جدول ۸- نتایج تجربه واریانس بین تیمارهای خاک و زی توده دو گونه کاج بروسیا و کاج حلب

کیفیت نهال	شاخص	وزن خشک ساقه	وزن خشک ریشه	وزن خشک کل	وزن خشک به ساقه	
۱۶/۳۸۹ ۰/۰۰۰*	۲/۶۱	۲۵/۱۴۴	۹/۱۵۸	۱۷/۳۲۲	F	کاج بروسیا
	۰/۱ns	۰/۰۰۰*	۰/۰۰۰*	۰/۰۰۰*	P	
۲۳/۴۲۷ ۰/۰۰۰*	۰/۱۵۳	۱۹/۱۲	۲۶/۰۴۸	۱۱/۲۷۹	F	کاج حلب
	۰/۹۲۶ns	۰/۰۰۰*	۰/۰۰۰*	۰/۰۰۰*	P	

*: معنی دار بودن اختلاف بین میانگین ها ns: عدم تفاوت معنی دار بین میانگین ها

جدول ۹- میانگین صفات زی توده نهال های گلدنی یک ساله کاج بروسیا و کاج حلب تولید شده در ۴ بستر مختلف رشد

بستر رشد	وزن خشک ساقه	وزن خشک کل	وزن خشک ریشه	وزن خشک به ساقه	وزن خشک ریشه	وزن خشک کل	وزن خشک ریشه	وزن خشک ساقه	شاخص کیفیت نهال
(تیمار ۱)	۲/۲۴(۰/۱۴)c*	۲/۲۸(۰/۰۵)b*	۴/۵۳(۰/۱)c*	۱/۰۳(۰/۰۸)*	۰/۹۹(۰/۰۴)b*				
(تیمار ۲)	۳/۰۶(۰/۲۴)bc*	۲/۸۴(۰/۲۳)b*	۰/۹۵(۰/۱۲)		۰/۹۱(۰/۰۵)b*				کاج
(تیمار ۳)	۳/۵۱(۰/۲)b*	۲/۷۲(۰/۲۱)b*	۶/۲۳(۰/۳۸)b*	۰/۷۸(۰/۰۵)*	۰/۹(۰/۰۶)b*				بروسیا
(تیمار ۴)	۴/۸۹(۰/۴)a*	۳/۶۳(۰/۱۹)a*	۸/۵۲(۰/۴۲)a*	۰/۷۶(۰/۰۷)	۱/۳۵(۰/۰۵)a*				
(تیمار ۱)	۰/۴(۰/۱۶)c	۰/۲۱(۰/۰۶)c	۰/۵۷(۰/۰۵)	۰/۱(۰/۰۳)c					
(تیمار ۲)	۱/۱۹(۰/۱۸)b	۰/۶۲(۰/۰۵)b	۱/۸۱(۰/۲)b	۰/۵۷(۰/۱۱)	۰/۲۸(۰/۰۱)b				
(تیمار ۳)	۰/۹۵(۰/۲)b	۰/۵۴(۰/۰۵)b	۱/۵(۰/۲۵)b	۰/۶۱(۰/۰۷)	۰/۲۴(۰/۰۳)b				
(تیمار ۴)	۱/۸۱(۰/۱۴)a	۰/۹۴(۰/۰۶)a	۲/۷۵(۰/۰۹)a	۰/۵۴(۰/۰۷)	۰/۴۱(۰/۰۳)a				

اعداد داخل پرانتز اشتباہ از معیار هستند. حروف مختلف در ستون میانگین معنی دار بودن میانگین ها در سطح احتمال ۰/۰۵ با آزمون دانکن است.

*: نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف صفت مورد بررسی در تیمار خاک مشابه بین دو گونه با استفاده از آزمون t است.

بهطوری که وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک کل و شاخص کیفیت نهال در گونه کاج بروسیا در همهٔ تیمارهای خاک مقدار بیشتری را نسبت به کاج حلب نشان می‌دهد (جدول ۱۰).

- مقایسهٔ تفاوت صفات دو گونه افزودن مواد آلی به خاک سبب بهبود شاخص‌های زنده‌مانی، رشد و مقدار زیستوده نهال‌ها شد و شدت تأثیر آن به تفکیک دو گونه با یکدیگر متفاوت بود (جدول ۱۰)،

جدول ۱۰- نتایج آزمون t در مقایسهٔ پارامترهای مورد مطالعه دو گونه کاج بروسیا و کاج حلب در هر تیمار خاک

پارامترها									
(تیمار ۴)		(تیمار ۳)		(تیمار ۲)		(تیمار ۱)			
P	t	P	t	P	t	P	t		
۰/۲۱۵	۱/۵۷	۰/۶۳۸	۰/۵۲۲	۱	۰/۰۰۰	۰/۲۳۹	۱/۴۶	درصد زنده‌مانی	
۰/۰۱۷*	۴/۸۳	۰/۰۲۷*	۴/۰۷۵	۰/۱۴۴	۱/۹۷	۰/۰۵۳	۳/۱	طول ساقه (سانتی‌متر)	
۰/۱۰۲	۲/۳۳	۰/۱۶	۱/۸۶	۰/۲۵۷	۱/۳۹۸	۰/۰۰۳*	۸/۶	قطر یقه (میلی‌متر)	
۰/۰۴*	۳/۴۹۵	۰/۰۷۲	۲/۷۳۵	۰/۰۰۱*	۱۲/۲۴	۰/۰۸۶	۲/۵۲	طول ریشه (سانتی‌متر)	
۰/۰۲۶*	۴/۱۳	۰/۰۵۱	۳/۱۵۸	۰/۰۰۶*	۷/۱	۰/۰۱۶*	۴/۸۹	طول کل نهال (سانتی‌متر)	
۰/۶۸۴	۰/۴۴۸	۰/۰۳۴*	۳/۷۱۵	۰/۰۹۲	۲/۴۵	۰/۲۳	۱/۵	طول ساقه به قطر یقه	
۰/۹۳۶	۰/۰۸۸	۰/۳	۱/۲۵	۰/۰۰۲*	۱۰/۰۲	۰/۸۵	۰/۲۰۶	طول ریشه به ساقه	
۰/۰۰۳*	۹/۱۷۱	۰/۰۶۸	۲/۷۹۲	۰/۲۰۲	۱/۶۲۹	۰/۲۲۹	۱/۵۰۶	نرخ رشد نسبی ارتفاعی	
۰/۰۶۱	۲/۹۳۶	۰/۸۳۳	۰/۲۳	۰/۷۸۴	۰/۳	۰/۰۶۹	۲/۷۷۶	نرخ رشد نسبی قطري	
۰/۰۲۶*	۳/۶۱۲	۰/۰۷۵	۲/۶۸۲	۰/۰۱۴*	۵/۱۸۱	۰/۰۲*	۴/۵۶	شاخص بنیه نهال	
۰/۰۱*	۵/۹۳۷	۰/۰۰۱*	۱۱/۵۷۹	۰/۰۰۳*	۸/۸۹۸	۰/۰۰۰*	۷۰/۶۷	وزن خشک ساقه (گرم)	
۰/۰۰۲*	۱۰/۷۰۴	۰/۰۰۳*	۹/۳۹۹	۰/۰۰۱*	۱۱/۹۴	۰/۰۰۰*	۱۸/۹۹	وزن خشک ریشه (گرم)	
۰/۰۰۱*	۱۱/۷۹۱	۰/۰۰۲*	۱۰/۷۸۴	۰/۰۰۰*	۲۲/۸۳	۰/۰۰۰*	۳۰/۵۲	وزن خشک کل (گرم)	
۰/۲۱۴	۱/۵۷	۰/۰۴۵*	۳/۳۲	۰/۰۹۵	۲/۴	۰/۰۰۵*	۷/۶۸	وزن خشک ریشه به ساقه	
۰/۰۰۱*	۱۱/۵۸	۰/۰۰۳*	۸/۷۵۴	۰/۰۰۱*	۱۱/۸۷	۰/۰۰۰*	۲۰/۷	شاخص کیفیت نهال	

* معنی‌دار بودن میانگین‌ها

تیمار (۱): خاک نهالستان (شاهد)، تیمار (۲): خاک شاهد: خاکبرگ (۱:۵)، تیمار (۳): خاک شاهد: کود دامی (۱:۵)، تیمار (۴): خاک شاهد: کود دامی (۱:۵)

تحریک گیاه در جذب عناصر غذایی و افزایش فعالیت آنزیم‌ها و متابولیسم گیاه و افزایش غلظت قندها، پروتئین‌ها، اسیدهای آلی و عناصر معدنی بافت گیاه می‌شود و از این راه، گیاه را قوی و درصد زنده‌مانی و رشد آن را افزایش می‌دهد (Caravaca *et al.*, 2009) و Oliet *et al.* (2002) و (2009). *P. halepensis* به ترتیب با بررسی کمپوست ضایعات حاصل از درختان و استفاده از کود مایع با مقادیر مختلف، همبستگی قوی و معنی‌داری را بین حاصلخیزی خاک و افزایش عناصر تغذیه‌ای بافت گیاه به ویژه پتانسیم و فسفر

بحث همبستگی معنی‌دار بین برخی عناصر تغذیه‌ای از جمله نیتروژن، فسفر و پتانسیم قابل جذب با درصد زنده‌مانی و شاخص‌های رشد در تحقیق حاضر و نقش این عناصر در ایجاد شرایط تهويه‌ای و رژیم رطوبتی مناسب‌تر خاک و نیز دسترسی آسان‌تر نهال به مواد تغذیه‌ای (ملکوتی و همایی، ۱۳۸۳)، می‌تواند تأثیر معنی‌دار مواد آلی بر هر دو گونه مورد بررسی را توجیه کند. در واقع، افزودن مواد آلی (در حد مطلوب بسته به نیاز فیزیولوژی و شرایط اکولوژیکی هر گیاه) به خاک، مانند عملکرد هورمون‌های گیاهی، سبب

Picea abies L. در Kaakenin *et al.* (2004) روی نهال *Picea abies* بررسی تأثیر افزایش مقادیر متفاوت نیتروژن بر روی زی-توده و پژوهش Pinus Auina *et al.* (2007) روی *Pinus sylvestris* در بررسی تأثیر افزودن ترکیبی از خاکبرگ کاج و بلوط بر روی زی-توده گیاه همسو است. همچنین نتایج تحقیقات P. abies روی Kärkönen *et al.* (2002) افزایش فعالیتهای متابولیکی آنزیمهای و بهبود شرایط از جمله افزایش عناصر تغذیهای پتاسیم و کلسیم خاک و عناصر تغذیهای نیتروژن و فسفر گیاه و نتایج تحقیقات Simard *et al.* (2003) روی نهالهای گونه‌های سوزنی برگ، افزایش دمای خاک و تأمین رطوبت و عناصر غذایی خاک اطراف ریشه و نتایج یافته‌های Rinco'n *et al.* (2006) روی *P. halepensis*, بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را سبب افزایش مقدار زی-توده نهال در تیمارهای مواد آلی عنوان کرد. در مجموع، در راستای پاسخ به اهداف این تحقیق می‌توان اظهار داشت که اندازه‌های بیشتر نرخ زنده‌مانی، شاخص‌های رشد و زی-توده نهالهای دو گونه کاج بروسیا و کاج حلب در تیماری با بیشترین مواد آلی (تیمار^۴) بهدست آمد. از آنجا که به طور معمول درصد زنده‌مانی و شاخص کیفیت نهال برای ارزیابی وضعیت نهالهای گونه‌های گیاهی استفاده می‌شود و در تحقیق حاضر شاخص کیفیت نهال در گونه کاج بروسیا بزرگ‌تر از گونه کاج حلب است، می‌توان عنوان کرد که تولید نهال کاج بروسیا در مقایسه با کاج حلب از موفقیت بیشتری در شرایط آب و هوایی نهالستان کلوده برخوردار است. علت این موضوع را می‌توان اختصاصی بودن واکنش هر گیاه به مقدار عناصر تغذیه‌ای خاک و همچنین تأثیر عوامل زننده‌کننده، عوامل محیطی و فرایند متابولیسم و شرایط فیزیولوژیکی درونی گیاه (Barker & Pilbeam, 2007)، دانست. بسته به مناطق متفاوت اکولوژیک (محلی)، دیگر ترکیبات آلی، شامل کمپوست ضایعات آلی مسکونی، پسماندهای کشاورزی، کودهای زیستی و ضایعات تفاله نیشکر، پوسته کاج و پوسته نارگیل برای برخی گونه‌های جنگلی، ممکن است تولید کمی و کیفی نهال‌ها را بهبود بخشنند.

ثبت کردند و همچنین در غلظت زیاد پتاسیم برگ و کاهش تعرق، بهدلیل اثر تنظیمی این یون بر فعالیت استومات‌ها، افزایش زنده‌مانی را نتیجه گرفتند. Trubat *et al.* (2008) نشان دادند که شدت زنده‌مانی و رشد به نوع گونه و شرایط تغذیه‌ای آن بستگی دارد. در تأیید این مطلب، Tabari *et al.* (2007) در تحقیق خود بر روی گونه Cupressus sempervirens L. و Pinus Solla-Gullo'n *et al.* (2008) بر روی گونه radiata D. Don پی افزایش مقدار کود دامی پوسیده به خاک و کمپوست حاصل از پوسته درختان نتیجه گرفتند. به عبارت دیگر با بهبود وضعیت تغذیه‌ای خاک و جذب بیشتر کردن توسط گیاه، همچنین دسترسی به نور بیشتر بهدلیل افزایش شدت فتوسنترز، بیشترین تولید گیاه را گزارش کردند. در همین راستا، خاکبرگ‌ها نیز بهدلیل دارا بودن هوموس کافی، عناصر غذایی فراوان و تهویه مناسب، سریع‌تر آزاد شدن عناصر غذایی و دارا بودن رژیم رطوبتی مناسب، شرایط مطلوبی را برای افزایش بقا و دوام گیاه در مقابل عامل‌های محیطی و افزایش رشد گیاه فراهم می‌کنند (Bastida *et al.*, 2008).

نبود همبستگی معنی‌دار بین طول ریشه و غلظت عناصر تغذیه‌ای خاک در تحقیق حاضر، ممکن است بهدلیل وجود مواد غذایی کافی در اطراف ریشه، که لزوم گسترش بیشتر Rieske برای جذب عناصر غذایی را منتفی می‌کند (Agren & Franklin, 2003)، یا بهدلیل حجم محدود گلدان، که رشد بیشتر ریشه را با مشکل مواجه می‌سازد، باشد (Oliet *et al.*, 2004). همچنین در خاک‌های فقیر، کرین بیشتر به ریشه‌ها اختصاص می‌یابد تا برای دست‌یابی به مواد غذایی و رطوبت، گسترش بیشتری یابند، در حالی که در خاک‌های حاصلخیز، کربن بیشتر در برگ و ساقه تجمع می‌یابد و اگر رطوبت خاک برای فعالیتهای گیاه کافی نباشد، کرین بیشتر برای رشد ریشه نسبت به رشد ساقه مصرف خواهد شد (Olykan *et al.*, 2008).

همبستگی زیاد زی-توده با عناصر تغذیه‌ای خاک در تحقیق حاضر نیز مؤید افزایش زی-توده و شاخص کیفیت نهال‌های مورد بررسی است. نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش

منابع

- Dhindwal, A.S., B.P.S. Lather & J. Singh, 1991. Efficacy of seed treatment on germination, seedling emergence and vigour of cotton (*Gossypium hirsutum*) genotypes, *Seed Research Journal*, 19 (1-2): 59-61.
- Guerrero, F., J.M. Gasco & L. Hernández-Apaolaza, 2002. Use of pine bark and sewage sludge compost as components of substrates for *Pinus pinea* and *Cupressus arizonica* production, *Plant Nutrition Journal*, 25 (1): 129-141.
- Kaakenin, S., A. Joikkonen, S. Livonen & E. Vapaavuori, 2004. Growth, allocation and chemistry of *Picea abies* seedlings affected by nutrient supply during second growing season, *Tree Physiology Journal*, 24 (6): 707-719.
- Kärkönen, A., S. Koutaniemi, M. Mustonen, K. Syrjänen, G. Brunow, I. Kilpeläinen, T.H. Teeri & L.K. Simola, 2002. Lignification related enzymes in *Picea abies* suspension cultures, *Physiology Plant Journal*, 114 (3): 343-353.
- Katalin, B., K. Tama's & D. Katalin, 2005. Effect of Organic Matter Recycling in Long-term Fertilization Trials and Model Pot Experiments, *Soil Science and Plant Analysis Journal*, 36 (1-3): 191-202.
- Larcheveque, M., C. Ballini, N. Korbolewsky & N. Montes, 2006. The use of compost in afforestation of Mediterranean areas: Effects on soil properties and young tree seedlings, *Science of the Total Environment Journal*, 369 (1-3): 220-230.
- Larcheveque, M., N. Monte's, V. Baldy & C. Ballini, 2008. Can compost improve *Quercus pubescens* Willd establishment in a Mediterranean post-fire shrubland, *Bioresource Technology Journal*, 99 (9): 3754-3764.
- Marianthi, T, 2006. Kenaf (*Hibiscus cannabinus* L.) core and rice hulls as components of container media for growing (*Pinus halepensis* M.) seedlings, *Bioresource Technology Journal*, 97 (14): 1631-1639.
- Navarro, R.M., M.J. Retamosa, J. Lopez, A.D. Campo, C. Ceaceros & L. Salmoral, 2006. Nursery practices and field performance for the endangered Mediterranean species *Abies pinsapo* Boiss, *Ecological Engineering Journal*, 27 (2): 93-99.
- Oliet, J.A., R. Planelles, F. Artero, R. Valverde, D.F. Jacobs & M.L. Segura, 2009. Field performance of *Pinus halepensis* planted in Mediterranean arid conditions: relative influence of seedling morphology and mineral nutrition, *New Forests Journal*, 37 (3): 313-331
- Rhamani, Ahmed, مصطفی خوشنویس و محسن نورشاد, ۱۳۸۵. واکنش نهال‌های افرا پلت به کودهای شیمیایی و دامی در دو نهالستان جنگلی شهر پشت چالوس و کلوده آمل، مجله پژوهش و سازندگی، ۱۹ (۴): ۱۴۹-۱۴۳.
- زرین‌کفش، منوچهر، ۱۳۷۲. خاکشناسی کاربردی-ارزیابی و مورفو‌لوزی و تجزیه‌های کمی خاک-آب-گیاه، انتشارات دانشگاه تهران، شماره ۳۴۲، تهران، ص ۳۴۲.
- کیانی، بهمن، ۱۳۷۸. مطالعه توان ریشه‌زایی نهال‌های کاج تدا (*Pinus taeda*) در شرایط ریشه لخت و گلدانی، مجله انتشارات طبیعی ایران، ۵۸ (۲): ۳۳۸-۳۳۳.
- ملکوتی، محمد جعفر و مهدی همایی، ۱۳۸۳. حاصلخیزی خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک «مشکلات و راه حل‌ها»، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۸۲، تهران، ص ۴۸۲.
- Agren, G.I. & O. Franklin, 2003. Root: shoot ratios, optimization and nitrogen productivity, *Annals of botany Journal*, 92 (6): 795-800.
- Auina, A., M. Rudawska, T. Leski, A. Skridalia, E. Riepas & M. Iwanski, 2007. Growth and mycorrhizal community structure of *Pinus sylvestris* seedlings following the addition of forest litter, *Applied and Environmental Microbiology Journal*, 15 (73): 4867-4873.
- Barker A.V. & D.J. Pilbeam, 2007. Handbook of plant nutrition. Taylor& Francis Press, New York, 613pp.
- Bastida, F., E. Kandeler, J.L. Moreno, M. Ros, C. García & T. Hernández, 2008. Application of fresh and composted organic wastes modifies structure, size and activity of soil microbial community under semiarid climate, *Applied Soil Ecology Journal*, 40 (2): 318-329.
- Caravaca, F., C. Garcia, M.T. Hernandez & A. Roldan, 2002. Aggregate stability changes after organic amendment and mycorrhizal inoculation in the afforestation of a semiarid site with *Pinus halepensis*, *Applied Soil Ecology Journal*, 19 (3): 199-208.
- Cobb, W.R., R.E. Will, R.F. Daniels & M.R. Jacobson, 2008. Aboveground biomass and nitrogen in four short-rotation woody crop species growing with different water and nutrient availabilities, *Forest Ecology and Management Journal*, 255 (12): 4032-4039.

- control and annual N fertilizer, *Forest Ecology and Management Journal*, 227 (1-2): 155-168.
- Zhao, C. & Q. Liu, 2009. Growth and photosynthetic responses of two coniferous species to experimental warming and nitrogen fertilization, *Canadian Journal of Forest Research*, 39(1): 1-11.
- Oliet, J.A., R. Planelles, M.L. Segura, F. Artero & D.F. Jacobs, 2004. Mineral nutrition and growth of containerized *Pinus halepensis* seedlings under controlled-release fertilizer, *Horticulturae Journal*, 103 (1): 113-129.
- Olykan, S.T., J. Xue, P.W. Clinton, M.F. Skinner, D.J. Graham & A.C. Leckie, 2008. Effect of boron fertilizer, weed control and genotype on foliar nutrients and tree growth of juvenile *Pinus radiata* at two contrasting sites in New Zealand, *Forest Ecology and Management Journal*, 255 (3-4): 1196-1209.
- Ostos, J.C., R. Lopez-Garrido, J.M. Murillo & R. Lopez, 2008. Substitution of peat for municipal solid waste- and sewage sludge-based composts in nursery growing media: Effect on growth and nutrition of the native shrub *Pistacia lentiscus* L, *Bioresource Technology Journal*, 99 (6): 1793-1800.
- Rinco'n, A., B. Rui'z-Díez, M. Fernández-Pascual, A. Probanza, J.M. Pozuelo & M.R. de Felipe, 2006. Afforestation of degraded soils with *Pinus halepensis* Mill.: Effects of inoculation with selected microorganisms and soil amendment on plant growth, rhizospheric microbial activity and ectomycorrhizal formation, *Applied Soil Ecology Journal*, 34 (1): 42-51.
- Simard, M.J., Y. Bergeron & L. Sirois, 2003. Substrate and litterfall effects on conifer seedling survivorship in southern boreal stands of Canada, *Canadian Journal of Forest Research*, 33 (4): 672-681.
- Solla-Gullo'n, F., M. Santalla, C. Pérez-Cruzado, A. Merino & R. Rodríguez-Soalleiro, 2008. Response of *Pinus radiata* seedlings to application of mixed wood-bark ash at planting in a temperate region: Nutrition and growth, *Forest Ecology and Management Journal*, 255 (11): 3873-3884.
- Tabari, M., H.R. Saeidi, K. Alavi-Panah, R. Basiri & M.R. Poormadgidian, 2007. Growth and survival response of potted *Cupressus sempervirens* seedlings to different soils, *Pakistan Journal of Biological Sciences* 10 (8): 1309-1312.
- Trubat, R., J. Cortina & A. Vilagrosa, 2008. Short-term nitrogen deprivation increases field performance in nursery seedlings of Mediterranean woody species, *Arid Environments Journal*, 72 (6): 879-890.
- Will, R.E., D. Markewitz, R.L. Hendrick, D.F. Meason, T.R. Crocker & B.E. Borders, 2006. Nitrogen and phosphorus dynamics for 13-year-old loblolly pine stands receiving complete competition

Effect of organic matter compositions on growth and production performance of *Pinus brutia* Ten. and *P. halepensis* Mill. seedlings

F. Ahmadloo¹, M. Tabari^{*2}, A. Rahmani³, H. Yousefzadeh⁴ and Y. Kooch⁴

¹M.Sc. Student, Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat Modares, I. R. Iran

²Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat Modares, I. R. Iran

³Assistant Prof. of Research Institute of Forest and Rangelands, I. R. Iran

⁴Ph.D Student, Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat Modares, I. R. Iran

(Received: 28 April 2009, Accepted: 3 October 2009)

Abstract

This research was conducted on the status of growth, biomass, survival and performance of needle-leaved species of Brutia pine (*Pinus brutia* Ten.) and Aleppo pine (*P. halepensis* Mill.) with different combinations of organic matter in Koloudeh nursery located in Amol (north of Iran). Seeds in plastic pots were sown as randomized completely design (RCD) with four replications at different treatments of soil including: T1) nursery soil (control), T2) control soil:cattle manure (5:1), T3) control soil:decomposed litter (5:1), T4) control soil:cattle manure:decomposed litter (5:1:1). The results after one year showed that seedlings of T4 obtained better survival rate, shoot height, collar diameter, seedling Vigor Index, shoot dry weight, root dry weight, total dry weight and seedling Quality Index (QI) in both species. A highly positive significant correlation was detected between soil nutrition and characteristics of survival rate, shoot height, collar diameter, shoot dry weight and root dry weight in both species. There was a better response in most of characteristics for *P. brutia* compared to *P. halepensis*. It is concluded that higher soil organic matter, due to proper physical and nutritional properties of soil media, increases the seedling quantity and quality.

Key words: Biomass, Quality index, Soil-media, Survival, Vigor index.