

بررسی تغییرات ضریب شکل درختان راش (*Fagus orientalis Lipsky*) با توجه به مراحل رویشی و فیزیوگرافی رویشگاه

امیر اسلام بنیاد^۱، جواد ترکمن^{۲*} و اسماعیل روحی^۳

^{۱,۲,۳}دانشیار، استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگل‌داری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

(تاریخ دریافت: ۹۰ / ۷ / ۱۰، تاریخ پذیرش: ۹۱ / ۶ / ۲۶)

چکیده

با توجه به اینکه شکل ساقه درخت به صورت استوانه کامل نیست، برای برآورد حجم واقعی آن، باید ضریب شکل برای هر گونه محاسبه شود. ضریب شکل پس از قطر برابریته و ارتفاع درخت، سومین مشخصه مؤثر در تعیین حجم درخت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر همزمان مؤلفه‌های رویشگاه مانند جهت جغرافیایی، شبیه زمین و مراحل رویشی بر ضریب شکل درختان راش در جنگل‌های طبیعی حوضه شفارود گیلان انجام گرفت. به این منظور، ۴۱۱ اصله درخت در چهار جهت جغرافیایی (شمال، شمال شرق، شرق و شمال غرب) و در چهار کلاس شبیه کمتر از ۳۰، ۳۰-۴۵ و ۴۵-۶۰ و بیش از ۶۰ درصد و در چهار مرحله رویشی جوانی، میانسالی، مسن و کهنسالی اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل تأثیرات مستقل و متقابل داده‌ها از تحلیل سه‌عامله در قالب طرح تصادفی کامل استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، برای مقایسه میانگین داده‌ها با واریانس همگن از آزمون دانکن و واریانس ناهمگن از آزمون دانت در سطح اطمینان ۵ و ۱ درصد استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که بین تیمارهای بررسی ضریب شکل درختان راش تفاوت معنی‌دار وجود دارد. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از روش دانت نشان داد که بین ضریب شکل طبیعی ساقه راش تفاوت معنی‌دار وجود دارد. این بررسی نشان می‌دهد که با افزایش شبیه رویشگاه، ضریب شکل نیز افزایش می‌یابد و در جهت شمالی این عدد به یک نزدیک‌تر است.

واژه‌های کلیدی: راش، مراحل رویشی، ضریب شکل، هوهه‌نادل، شفارود.

مؤثر است (مروی مهاجر، ۱۳۵۵). عامل‌های فیزیوگرافی و مؤلفه‌های شکل زمین (شیب، ارتفاع از سطح دریا و جهت‌های جغرافیایی)، چگونگی و مقدار رویش گیاهان و در نهایت شکل ظاهری آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بسته به جهت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و مقدار شیب، درجه حرارت، نحوه انتشار رطوبت، جهت وزش باد، مقدار برف و ... متفاوت خواهد بود که سبب ایجاد میکروکلیمای خاص می‌شود (Enright *et al.*, 2005).

بررسی‌های انجام گرفته نشان داد که کیفیت و رنگ چوب گونه‌های مختلف راش متأثر از سن و شرایط رویشگاهی است (Albert *et al.*, 2003; Liu *et al.*, 2005؛ ۱۳۵۵). پارساپژوه، (پارساپژوه، ۱۳۵۵؛ Liu *et al.*, 2005؛ Albert *et al.*, 2003) میرعبداللهی (۱۳۸۸) نیز اثر سن را بر متغیرهای رویشی درخت راش جنگل‌های حوضه لومیر در کلاسه‌های سنی جوان، میانسال، مسن و کهنسال بررسی کرد. نتایج نشان داد که ضریب شکل‌های مصنوعی و طبیعی ساقه و درخت در گونه راش در چهار کلاسۀ سنی اختلاف معنی دار دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر جهت جغرافیایی، شیب و مراحل رویشی بر ضریب شکل گونه راش حوضه شفارود انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

- منطقه مورد بررسی

این بررسی در حوضه آبخیز شماره ۹ منطقه شفارود استان گیلان انجام گرفت. این حوضه یکی از حوضه‌های آبخیز غرب استان گیلان با مساحت ۳۷۴۶۷,۶۷ هکتار، ارتفاع متوسط ۱۴۵۰ متر و شیب عمومی ۴۵/۸۲ درصد است و از نظر مختصات جغرافیایی در طول جغرافیایی ۵۱°۰۵' و ۴۸°۰۰' و عرض جغرافیایی ۳۷°۴۹' و ۱۵°۰۰' شرقی و عرض شفارود ۲۳°۰۷' و ۳۷°۴۰' شمالی قرار دارد. چهار پارسل این حوضه که در زمان تحقیق، عمل قطع در آنها صورت گرفته بود، به عنوان محل اصلی تحقیق و اجرای عملیات میدانی انتخاب شد: پارسل ۳ از سری ۸ به نام دشت دامن با جهت عمومی شمالی، پارسل ۳۰ از سری ۱۴ به نام رزداره پشت با جهت عمومی شمال غربی، پارسل ۴۱ از سری ۱۱ به نام آواردیم با جهت عمومی شرقی و پارسل ۳۷ از سری ۱۱ به

مقدمه و هدف

آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر شکل تنه یکی از پایه‌های تعیین صحیح حجم درخت است. بیشترین حجم درختان در واحد سطح جنگل‌های شمال به راشستان‌ها تعلق دارد (طاهری و پیلهور، ۱۳۸۷). توده‌های جنگلی در شرایط طبیعی، مراحل مختلف تحول و تکامل را می‌گذرانند. درختان به عنوان اصلی ترین اعضای توده‌های جنگلی تحت تأثیر محیط قرار می‌گیرند و برایند این تأثیرات، تغییرات داخلی و خارجی درختان است. از تغییرات داخلی به تغییر شیمیایی درختان، و از تغییرات ظاهری و خارجی به تغییر شکل ساقه درختان می‌توان اشاره کرد. طرز قرارگرفتن درخت در موقعیت‌های مختلف سبب می‌شود که رویش قطری در تمام قسمت‌های تنه یکسان نباشد. از این رو قسمت‌های مختلف تنه شکل هندسی متفاوتی به خود می‌گیرند. حجم درخت متأثر از شکل درخت است (زبیری، ۱۳۸۴؛ نمیرانیان، ۱۳۸۵). از سوی دیگر حجم درخت در بسیاری از موارد از جمله حاصلخیزی خاک، روند بهبود یا تخریب رویشگاه، مقدار مجاز برداشت، مقدار رویش، خرید و فروش چوب و بررسی کارهای تحقیقاتی کاربرد دارد. همچنین شکل درخت یکی از عوامل مهم و مؤثر بر بذردهی و زادآوری درختان جنگلی است (بنیاد، ۱۳۸۳؛ مروی مهاجر، ۱۳۵۴). با توجه به اینکه شکل درخت منظم نیست و به طور کامل از هیچ‌یک از شکل‌های هندسی تبعیت نمی‌کند، پژوهشگران سعی کرده‌اند با بررسی درختان در شرایط متفاوت، شاخص‌ها، ضرایب تصحیح و روابط ریاضی فرآگیری را ارائه دهند. با توجه به اینکه ساقه درخت استوانه‌ای نیست، باید حجم استوانه در ضریب ضرب شده تا حجم آن به حجم واقعی درخت نزدیک‌تر شود. این ضریب، در اندازه‌گیری جنگل با عنوان ضریب شکل معرفی و تعریف می‌شود. ضریب شکل سومین مشخصه‌ای است که در کنار قطر برابر سینه و ارتفاع یک درخت بر تعیین حجم آن تأثیر می‌گذارد. نظر به اینکه رویش قطری در تمام قسمت‌های تنه یکسان نیست، با تغییر رویش قطری ضریب شکل درخت نیز تغییر می‌کند (زبیری، ۱۳۸۴). علاوه بر رویش قطری، عامل‌های رویشگاه و رقابت نیز در تغییر ضریب شکل درخت در طول زندگی

در این رابطه $d_{0/1}$, $d_{0/5}$, $d_{0/7}$ و $d_{0/9}$ به ترتیب، قطر در ارتفاع‌های ۱، ۰، ۱، ۰، ۵، ۰، ۷ و ۰، ۹ ارتفاع درخت است. برای تجزیه و تحلیل تأثیرات مستقل و متقابل عوامل بر ضریب شکل از طرح تصادفی کامل در قالب فاکتوریل سه‌عامله در چهار سطح و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانلت و دانکن با سطح اطمینان ۵ و ۱ درصد استفاده شد. در تجزیه و تحلیل این بررسی، جهت جغرافیایی، شبیه رویشگاه و مراحل رویشی به ترتیب با کد ۱، ۲ و ۳ نشان داده شد. هریک از این کلاسه‌ها به زیرکلاسه‌هایی تقسیم و کد دار شد. به این ترتیب که کلاسه‌های جهت جغرافیایی شامل شمال، شمال شرق، شرق و شمال غرب به ترتیب با کدهای ۱ تا ۴، کلاسه‌های شبیه رویشگاه شامل کمتر از ۳۰-۴۵، ۳۰-۶۰ و بیشتر از ۶۰ درصد به ترتیب با کدهای ۱ تا ۴ و کلاسه‌های مراحل رویشی شامل جوان، میانسال، مسن و کهنسال به ترتیب با کدهای ۱ تا ۴) نشان داده شد. داده‌ها و اطلاعات برداشت شده در نرم‌افزارهای Excel و Spss وارد و تجزیه و تحلیل شد. برای تشخیص نرمال بودن داده‌ها و همگنی واریانس به ترتیب از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف و لون استفاده شد.

نتایج

نتایج حاصل از اندازه‌گیری صفت‌های مورد بررسی ۴۱۱ اصله درخت نشان داد که تمام داده‌ها نرمال است، ولی واریانس آنها ناهمگن است. بنابراین به منظور مقایسه میانگین‌ها از آزمون Dunnett T3 استفاده شد. در جدول ۱، شاخص‌های آماری محاسبه شده برای هر یک از ضریب شکل‌های مصنوعی و طبیعی ساقه، هوهنهادل، مصنوعی و طبیعی درخت آورده شده است.

بر اساس این نتایج، دامنه تغییرات ضریب شکل طبیعی درخت 150.7 ± 0.5742 و دامنه تغییرات ضریب شکل مصنوعی ساقه 1123.3 ± 0.4861 است. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌ها در جدول ۲ نشان داده شده است.

نام آواردیم با جهت عمومی شمال شرقی. ارتفاع از سطح دریا در این پارسل‌ها بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ متر (جنگل میان‌بند) و شبیه بین ۳۰ تا ۸۰ درصد است. بیشتر درختان نشانه‌گذاری و قطع شده در این پارسل‌ها از گونه راش بودند.

- نمونه‌برداری

۴۱۱ اصله درخت راش (۱۰۹، ۱۰۵، ۹۶ و ۱۰۱) به ترتیب در جهت‌های شرق، شمال شرق، شمال و شمال غرب) در چهار کلاسه قطری کمتر از ۳۰ (جوان)، ۳۰-۶۰ (میانسال) ۶۰-۸۰ (مسن) و بیشتر از ۸۰ (کهنسال) سانتی‌متر و چهار کلاسه شبیه کمتر از ۳۰، ۳۰-۴۵، ۴۵-۶۰ و بیشتر از ۶۰ درصد انتخاب شد. برای هر یک از پایه‌ها، قطر برابر سینه به وسیله کالیپر با دقت میلی‌متر، ارتفاع نسبی (۰، ۱، ۰، ۳، ۰، ۵، ۰، ۷ و ۰، ۹) درخت بر حسب متر) و ارتفاع کامل درخت به وسیله سونتو اندازه‌گیری شد. برای محاسبه ضریب شکل مصنوعی و طبیعی درخت، همچنین ضریب شکل مصنوعی و طبیعی ساقه، به ترتیب از روابط ۱، ۲ و ۳ استفاده شد (زبیری، ۱۳۸۴).

$$f_r = \frac{v}{w_{1/50}} \quad \text{رابطه ۱}$$

$$f_r = \frac{v}{w_{0/1}} \quad \text{رابطه ۲}$$

$$f_{1/30} = \frac{d_m^2}{d_{1/50}^2} \quad \text{رابطه ۳}$$

$$f_{0/1} = \frac{d_m^2}{d_{0/1}^2} \quad \text{رابطه ۴}$$

در روابط بالا، f_r حجم کامل درخت، $w_{1/50}$ حجم استوانه‌ای است که ارتفاع آن برابر با ارتفاع درخت و قطر آن معادل قطر برابر سینه درخت، $w_{0/1}$ حجم استوانه‌ای است که ارتفاع آن برابر با ارتفاع درخت و قطر آن معادل قطر در ۰/۱ ارتفاع درخت است و d_m قطر در نصف ارتفاع درخت است که همان $d_{0/5}$ است. برای محاسبه ضریب شکل ساقه بر مبنای فرمول هوهنهادل^۱ نیز از رابطه ۵ استفاده شد.


$$f_{ho} = 0/2 \left(1 + \frac{d_{0/3}^2}{d_{0/1}^2} + \frac{d_{0/5}^2}{d_{0/1}^2} + \frac{d_{0/7}^2}{d_{0/1}^2} + \frac{d_{0/9}^2}{d_{0/1}^2} \right)^{\frac{5}{2}} \quad \text{رابطه ۵}$$

جدول ۱- نتایج محاسبه ضریب شکل درختان راش با روش‌های مختلف


انواع ضریب شکل	مصنوعی ساقه	طبیعی ساقه	هوهنهنادل	مصنوعی درخت	طبیعی درخت
تعداد	۴۱۱	۴۱۱	۴۱۱	۴۱۱	۴۱۱
میانگین	۰,۵۷۴۲	۰,۵۱۲۴	۰,۵۴۴۶	۰,۵۴۷۴	۰,۴۸۶۱
انحراف معیار	۰,۱۵۰۷۴	۰,۱۴۰۸۸	۰,۰۷۲۱۶	۰,۱۱۶۵۲	۰,۱۱۲۳۳
خطا	۰,۰۰۷۷۴	۰,۰۰۶۹۵	۰,۰۰۳۵۶	۰,۰۰۵۷۵	۰,۰۰۵۵۴

جدول ۲- آنالیز واریانس ضریب شکل‌های درخت راش

منابع تغییر	مجموع مربعات	df	میانگین مربعات	F	sig.
بین گروه‌ها	۱,۹۱۹	۴	۰,۴۸۰	۳۲,۴۲۸	۰,۰۰۰
داخل گروه‌ها	۳۰,۳۲۹	۲۰۵۰	۰,۱۰۱۵		
کل	۳۲,۲۴۸	۲۰۵۴			




شکل ۲- تغییرات ضریب شکل درختان در نتیجه تغییر شیب رویشگاه



شکل ۳- تغییرات ضریب شکل درختان در نتیجه تغییر جهت جغرافیایی


ضریب شکل‌های درخت راش متأثر از جهت جغرافیایی هستند. همان‌طور که شکل ۳ نشان می‌دهد، در بین جهت‌های مورد بررسی، جهت شمالی بیشترین تأثیر را داشته است.

نتایج مندرج در جدول ۲ نشان می‌دهد که ضریب شکل درختان راش مورد بررسی در سطح احتمال ۱ درصد با یکدیگر اختلاف معنی‌داری دارد. مقایسه میانگین ضریب شکلهای محسوسه شده، شکلهای ناشان داده شده است.




شکل ۱- مقایسه ضریب شکل مصنوعی ساقه، طبیعی ساقه و هوهنهنادل

نتایج مربوط به تأثیرات مستقل شیب و جهت جغرافیایی رویشگاه و مراحل رویشی درخت راش بر ضریب شکل‌های مصنوعی و طبیعی ساقه و درخت و همچنین ضریب شکل هوهنهنادل در شکل‌های ۲، ۳ و ۴ نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که هر یک از عوامل و مؤلفه‌های رویشگاه طبیعی در تغییرات ضریب شکل درختان راش مورد بررسی تأثیرگذارند.




شکل ۶- اثر توأم جهت جغرافیایی و شیب رویشگاه در تغییرات ضریب شکل‌ها



شکل ۷- اثر توأم شیب رویشگاه و مرحله رویشی در تغییرات ضریب شکل‌ها


بحث

آنالیز واریانس داده‌های حاصل از اندازه‌گیری ضریب شکل‌های مصنوعی و طبیعی ساقه، هوهنهنادل و ضریب شکل‌های مصنوعی و طبیعی درخت در سطح اطمینان $\alpha = 0,01$ نشان می‌دهد که میانگین‌های ضریب شکل‌های مختلف تفاوت معنی‌داری دارند. نتایج گروه‌بندی نشان می‌دهد که بین ضریب شکل طبیعی ساقه و هوهنهنادل تفاوت وجود ندارد، ولی در دیگر ضرایب، تفاوت معنی‌دار است. مقادیر متوسط به دست آمده برای ضریب شکل‌های مصنوعی و طبیعی ساقه، هوهنهنادل و ضریب شکل‌های مصنوعی و طبیعی درخت به ترتیب $0,49, 0,55, 0,54, 0,51$ و $0,57$ است. امینی و همکاران (۱۳۸۶) ضریب شکل‌های مصنوعی ساقه، هوهنهنادل و میانگین ضریب شکل درختان راش در جنگل هفت خال ساری را به ترتیب $0,48, 0,49$ و $0,48$ اعلام کردند. همچنین زیری و نجاران در سال ۱۳۶۳ ضریب شکل درخت راش در جنگل‌های ویسر را بررسی



شکل ۴- تغییرات ضریب شکل درختان در نتیجه تغییر مراحل رویشی

شکل درخت در مراحل زندگی از نهال تا کهنسالی در حال تغییر است و همان‌طور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، در دوران میانسالی بهترین حالت را دارد. در حالت طبیعی، ضریب شکل‌های درخت تحت تأثیر توأم و متقابل عوامل و مؤلفه‌های رویشگاه هستند. در اندازه‌گیری جنگل، نشان دادن اثر متقابل و توأم این عوامل در تغییرات ضریب شکل‌ها مهم است. نتایج مربوط به تأثیر متقابل جهت جغرافیایی و مراحل رویشی، جهت جغرافیایی و شیب و همچنین تأثیر متقابل شیب و مراحل رویشی بر ضریب شکل‌های مختلف درخت راش به ترتیب در شکل‌های ۶، ۵، ۶ و ۷ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، اثر توأم مراحل رویشی با جهت و شیب نشان می‌دهد که شکل درخت در جوانی بیشتر تحت تأثیر جهت جغرافیایی قرار دارد، در حالی که در مراحل میانسالی و کهنسالی، بیشتر متأثر از شیب رویشگاه است. اثر توأم شیب و جهت نشان می‌دهد که با وجود زیاد بودن ضریب شکل در جهت شمالی، اثر شیب سبب افزایش ضریب شکل در دیگر جهت‌ها شده است.



شکل ۵- اثر توأم جهت جغرافیایی و مرحله رویشی در تغییرات ضریب شکل‌ها

هوهنهنادل ساقه در جهت جغرافیایی شمال با دیگر جهت‌ها- مورد بررسی در سطح ۵ درصد اختلاف معنی‌داری دارد ($P=0,000$, $F=3,84$). همچنین شاخص شکل در جهت شمال غرب نیز با تمامی جهت‌های مورد بررسی اختلاف معنی‌دار دارد، اما بین جهت‌های شمال شرق و شرق هیچ اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. بیشتر بودن مقدار ضرایب در جهت شمالی نشان‌دهنده برتری رویشگاه‌های موجود در جهت شمال نسبت به جهت‌های شمال شرق، شمال غرب و شرق برای گونه راش است. نتایج نشان می‌دهد که شکل درخت در جهت شمالی به استوانه نزدیک است و هرچه درخت به استوانه نزدیک‌تر باشد، ضریب شکل آن به یک نزدیک‌تر است. بنابراین اثر جهت شمالی در بهبود وضعیت تولید و رویش درخت مؤثر است. اخوان و نمیرانیان (۱۳۸۶) در بررسی ضریب قدکشیدگی پنج گونه مهم درختی در جنگلهای خزری به این نتیجه رسیدند که گونه راش در جهت جغرافیایی شمال بیشترین ضریب قدکشیدگی و در جهت جنوب کمترین ضریب قدکشیدگی را دارد. البته موضوع سیندریک بودن تنہ درختان علاوه بر ویژگی‌های ژنتیکی به عوامل دیگری نظیر شرایط رقابتی درختان جوان و فاصله درختان از یکدیگر نیز وابسته است که باید در پژوهش‌ها مورد توجه قرار گیرد.

در این تحقیق مشخص شد که ضریب قدکشیدگی راش در جهت شمال غربی بیشتر از شمال شرقی است که این نتیجه با کم بودن دما و ساعات تابش نور و بیشتر بودن رقابت نوری در جهت شمال مطابقت دارد. همچنین این بررسی، تفاوت رویشگاه را در جهت‌های شمال و شمال غربی نسبت به دیگر جهت‌های جغرافیایی نشان می‌دهد.

تأثیر مراحل رویشی بر روی ضریب شکل‌ها در سطح اطمینان ۱ درصد معنی‌دار است. بیشترین ضریب شکل مربوط به دوران میانسالی است. در دوران جوانی ضریب شکل‌ها تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهند و در یک گروه قرار می‌گیرند. به طور کلی با افزایش سن، ضرایب شکل کاهش می‌یابد. ضریب شکل هوهنهنادل که منطبق بر ضریب شکل طبیعی ساقه است، نسبت به دیگر ضرایب تغییرات یکنواختی را نشان می‌دهد. از آنجا که در محاسبه ضریب شکل ساقه بر مبنای فرمول هوهنهنادل قطر در ارتفاعات

کردند و نتیجه گرفتند که ضریب شکل حقیقی درخت ۰,۵۲ تا ۰,۵۵ است. آنالیز واریانس داده‌های مربوط به تأثیر شیب رویشگاه بر ضریب شکل‌ها نشان می‌دهد که در سطوح اطمینان $1 = \alpha$ تفاوت معنی‌دار وجود دارد و با توجه به همگن بودن واریانس در این مرحله، گروه‌بندی دانکن نشان می‌دهد که ضریب شکل طبیعی ساقه و هوهنهنادل تفاوت معنی‌دار ندارند و در یک گروه قرار می‌گیرند ($p=0,165$). با افزایش شیب رویشگاه، ضریب شکل درختان مورد بررسی افزایش می‌یابد. نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت جهت جغرافیایی شمال بر ضریب شکل درخت راش است. انواع ضریب شکل‌ها با توجه به جهت جغرافیایی در سطح ۱ درصد دارای تفاوت معنی‌دارند. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین ضریب شکل مصنوعی ساقه در جهت شمالی ($0,5367$) و کمترین آن ($0,4597$) در جهت شمال شرقی به دست آمده است. در مورد ضریب شکل طبیعی ساقه نیز بیشترین مقدار ($0,5992$) در جهت شمالی است که در یک گروه قرار گرفته است و در دیگر جهت‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. ضریب هوهنهنادل نیز متأثر از جهت جغرافیایی است، به‌طوری‌که بیشترین مقدار در جهت شمالی ($0,5187$) و کمترین مقدار در جهت شرقی ($0,5999$) مشاهده می‌شود و بین شرق و شمال شرقی نیز تفاوت وجود ندارد. در مورد ضریب شکل‌های طبیعی و مصنوعی درخت نیز بیشترین مقدار مربوط به جهت شمالی است که با دیگر جهت‌ها دارای تفاوت معنی‌دار است. به‌طور کلی ضریب شکل‌های طبیعی بیشتر از مصنوعی است که ضریب هوهنهنادل در حد وسط آنها قرار دارد و با ضریب شکل طبیعی ساقه تفاوت معنی‌داری ندارد و به‌طور تقریبی بر آن منطبق است. میرعبداللهی (۱۳۸۸)، در بررسی تأثیر عامل سن بر متغیرهای رویشی درخت راش در جنگلهای حوضه لومیر، بین ضرایب شکل مصنوعی و طبیعی ساقه در گونه راش در چهار کلاسۀ سنی اختلاف معنی‌داری مشاهده کرد. میانگین ضریب شکل هوهنهنادل ساقه (f_{ho}) در چهار جهت جغرافیایی شمال، شمال شرق، شرق و شمال غرب به ترتیب $0,52$, $0,52$, $0,54$ و $0,56$ است. بررسی این ضریب با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که ضریب شکل

زیرا تنہ درختانی که از استوانه دورترند، دچار کمبود حجم برداشت می‌شوند و برای رفع مشکل باید جدول حجم را سه کلیده کرد. پیشنهاد می‌شود برای تهیه جدول حجم گونه راش با در نظر گرفتن عامل‌های مؤثر رویشگاه مانند شبی زمین، جهت جغرافیایی و همچنین مراحل رویشی، از ضریب شکل هوهنهنادل استفاده شود. از نتایج این تحقیق می‌توان در برنامه‌ریزی‌های فنی جنگل‌های طبیعی شمال کشور استفاده کرد.

منابع

اخوان، رضا و منوچهر نمیرانیان. ۱۳۸۶. بررسی ضریب قدکشیدگی پنج گونه مهم درختی در جنگل‌های خزری، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، ۱۵(۲): ۱۸۰-۱۸۵.

امینی، محمد، منوچهر نمیرانیان، خسرو ثاقب‌طالبی و داود پارساپژوه. ۱۳۸۶. بررسی شکل ساقه درختان راش بر مبنای شاخص‌های اندازه‌ای و جنگل‌شناسی، مجله منابع طبیعی ایران، ۶۰(۳): ۸۴۳-۸۵۸.

بنياد، اميراسلام، رمضانعلی پورستمی و بارييس مجنونيان، ۱۳۸۳. بررسی تأثير عامل شبیب بر ميزان مازاد مقطوعات درختان راش به روش بينه‌بری (مطالعه موردي: قطعه ۲۳، سري يك امامزاده ابراهيم گilan)، مجله منابع طبیعی ایران، ۵۷(۱): ۹۱-۹۶.

پارساپژوه، داود. ۱۳۵۵. بررسی کیفی چوب راش در رویشگاه‌های مختلف، مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۳۳. دانشگاه تهران.

حسن‌زاد، ايرج، منوچهر نمیرانیان، محمدرضا مهاجر و پیروز عزيزي. ۱۳۷۹، بررسی تأثير جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر ميزان حجم سريپاي راشستان‌های طبیعی اسلام، مجله منابع طبیعی ایران، ۵۳(۳): ۲۰۱-۲۱۵.

زبیری، محمود، ۱۳۶۳. بررسی ضریب شکل گونه راش در جنگل‌های ويسر (نوشهر). مجله منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۳۸: ۳۷-۳۳.

زبیری، محمود، ۱۳۸۴. آماربرداری در جنگل (اندازه‌گيري درخت و جنگل)، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۴۰ ص.

نسبی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اين ضریب شکل نسبت به دو ضریب شکل طبیعی و مصنوعی ساقه، دقت بیشتری دارد و اغلب به ضریب شکل واقعی درخت نزدیک‌تر است. مقدار واریانس، انحراف معیار و خطای ضریب هوهنهنادل از همه کمتر است. بنابراین نسبت به دو ضریب شکل دیگر ساقه از اعتبار بیشتری برخوردار است. نتایج نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مقدار عددی ضریب شکل هوهنهنادل، مربوط به جهت جغرافیایی شمال و بعد از آن شمال غرب است و کمترین مقدار این ضریب، مربوط به جهت شرق است. زياد بودن ضریب شکل، نشان دهنده نزدیک‌تر شدن شکل درخت به استوانه در همان طبقه قطری است. Jenny (1980) در تحقیق خود گزارش کرد که هر چه ساقه درخت استوانه‌ای تر باشد، حجم آن بیشتر و کیفیت آن بهتر است. از نظر صنعتی چنین درختانی ارزش اقتصادی بیشتری دارند. حسن‌زاد و همکاران (۱۳۷۹) بیشترین مقدار حجم سريپاي راشستان‌های طبیعی اسلام را به ترتیب در جهت‌های شمالی، شمال غربی، شمال شرقی، غربی و شرقی به دست آورده‌اند که نشان دهنده برتری رویشگاه‌های شمالی و شمال غربی است. تأثیر متقابل شبیب، جهت جغرافیایی و مراحل رویشی درخت نشان می‌دهد که ضریب شکل در درختان میانسالی که در جهت جغرافیایی شمال و شبیب‌های بیشتر رویشگاه قرار دارند، بیشتر است. نتایج این بررسی با پژوهش‌های دیگر محققان جنگل (Dudzińska, 2003; Enright et al., 2005) هماهنگی دارد. بهطور کلی عامل‌های شبیب و جهت جغرافیایی رویشگاه و مراحل رویشی بر ضریب شکل‌های درخت راش مؤثرند. تأثیر شبیب بر ضریب شکل مثبت است و ضریب شکل‌ها در جهت شمالی بیشتر از دیگر جهت‌های جغرافیایی است که نشان دهنده بهتر بودن کیفیت درختان در جهت شمال نسبت به دیگر جهت‌هast. ضریب شکل در مرحله میانسالی درخت به ۱ نزدیک‌تر است که نشان می‌دهد شکل ساقه درخت در این مرحله به استوانه نزدیک‌تر است. در بین ضریب شکل‌ها، روند تغییر ضریب شکل هوهنهنادل از دیگر ضریب شکل‌ها متعادل‌تر است. بنابراین ضریب شکل هوهنهنادل برای حجم‌یابی درختان راش در رویشگاه‌های میان‌بند که شکل درخت استوانه‌ای تر است مناسب است،

طاهری آبکنار، کامبیز و بابک پیلهور. ۱۳۸۷. جنگل‌شناسی.
انتشارات حق‌شناس، ۲۱۶ ص.

مروی مهاجر، محمد رضا، ۱۳۵۵. بررسی خصوصیات کیفی
راشستان‌های شمال کشور، مجله منابع طبیعی ایران،
دانشگاه تهران، ۳۴: ۹۶-۷۷.

مروی مهاجر، محمد رضا، ۱۳۵۴. بررسی رابطه بین
خصوصیات مورفولوژیک درخت راش با پایگاه، مجله منابع
طبیعی ایران، دانشگاه تهران، ۳۲: ۲۹-۱۴.

میرعبداللهی، مرتضی، ۱۳۸۸. بررسی تأثیر عامل سن بر
روی متغیرهای رویشی درخت راش در جنگل‌های حوزه
لومیر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، دانشکده
منابع طبیعی صومعه‌سرا، ۸۴ ص.

نمیرانیان، منوچهر، ۱۳۸۵. اندازه‌گیری درخت و
زیست‌سنگی جنگل، انتشارات دانشگاه تهران، ۵۷۴ ص.

Albert, L., T. Hofmann, Z.I. Nemeth & T. Retfalvi,
2003. Radial variation of total phenol content in
beech (*Fagus sylvatica* L.) wood with and without
red heartwood, *Journal of Natural Sciences*, 61(3):
227-230.

Dudzińska, M., 2003. Model of percentage of stem
section volume in the total stem volume for the
mountain and the lowland beech, *Sylwan*, 4: 28-33.

Enright, N.J., B.P. Miller & R. Akhtar, 2005. Desert
vegetation and vegetation-environment relationships
in Kirthar National Park, Sindh, Pakistan, *Journal of
Arid Environments*, 61: 397-418.

Jenny, H., 1980. The soil resource origin and
behavior, New York, Heidelberg, Berlin, 279-286.

Liu, S., C. Loup, J. Gril, O. Dumonceaud, A.
Thibaut & B. Thibaut, 2005. Studies on European
beech (*Fagus sylvatica* L.), Variations of wood
color parameters, *Journal of Forest Science*, 62:
625-632.

Growth stages and site components influence on form factors of beech (*Fagus orientalis Lipsky*)

A.E. Bonyad¹, J. Torkaman^{*2} and A. Rohi³

^{1,2}Associate and Assistant Prof., Faculty of Natural Resource, University of Guilan, I. R. Iran

³M.Sc.Graduate, Faculty of Natural Resource, University of Guilan, I. R. Iran

(Received: 1 October 2011, Accepted: 16 September 2012)

Abstract

Since tree stems are not cylindrical completely, an index called form factor is needed for estimating the real tree volume. The form factor is third effective component in determining the tree volume after diameter and height. The goal of the present study is to investigate the effects of tree growth stages and site components such as aspects and slope on form factors of Beech (*Fagus Orientalis Lipsky*). This study was carried out in the Shafaroud forests. In total 411 trees were sampled. These trees were sampled in 4 aspects (north, north-east, north-west and east) and also in the four slope class (<30, 30-45, 45-60 and > 60) with four growth stages. Normality and homogeneity of variance were done using Kolmogorov-Smirnov and Levene tests, respectively. Mean comparisons were performed using Duncan test for homogeneous variance and Dunnett for heterogeneous variance in 5 and 1 percent levels. Results showed that there is a significant difference between various form factors of tree. Dunnett test showed that there is no difference between real form factor of stem (0.5474) and Hohenadl (0.5446). Form factor values increased on north aspects.

Key words: Beech, Form factor, Growth stages, Hohenadl, Shafaroud.